

Aviso de exposición para las familias - Tos convulsa/tos ferina

Estimada familia:

Su hijo ha estado expuesto a tos convulsa. La tos convulsa es una infección respiratoria muy contagiosa.

¿Cuáles son los síntomas? Tos y mucosidad nasal que empeoran gradualmente. Toser fuerte podría provocar vómitos. En los episodios de tos agudos, los niños respirarán con dificultad, emitiendo un sonido ahogado. La tos puede empeorar en la noche. La persona infectada puede verse y sentirse sana entre los episodios de tos.

¿Cómo se propaga? Se propaga a través del aire cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. O se propaga por medio del contacto con superficies contaminadas con la mucosidad de la nariz o la garganta de una persona infectada.

¿Cuándo comienzan los síntomas? Alrededor de 7 a 10 días después de la exposición a una persona infectada u objetos contaminados.

¿Mi hijo debe quedarse en casa? Sí. El niño podrá regresar a la escuela después de 5 días de tratamiento con antibióticos o 21 días después del comienzo de la tos.

Muchos niños se vacunan contra la tos convulsa, pero podrían presentar síntomas leves. En caso de que aparezcan los síntomas y de que su hijo no haya sido vacunado, lleve a su hijo a un centro médico para que reciba el tratamiento necesario, y luego notifique al Centro de Aprendizaje Temprano de su hijo.

Miembro del personal: _____ Teléfono: _____

Centro: _____